

DABIGATRAN (PRADAXA®)



Votre médecin vous a prescrit le dabigatran pour prévenir la formation de caillots dans le sang



Le dabigatran, pris avec d'autres médicaments, aide à prévenir les AVC



Il s'agit d'un anticoagulant à prendre par la bouche et qui aide à « éclaircir » le sang



Prenez dabigatran **2 fois par jour** avec ou sans nourriture



Vous aurez une prise de sang pour vérifier la santé de vos reins **avant de commencer le dabigatran**, puis au moins une fois par année.



La fibrillation auriculaire est une raison courante de prendre ce médicament



La fibrillation auriculaire est un rythme cardiaque irrégulier qui peut favoriser la formation de caillots de sang et ainsi **causer un AVC**

La plupart des gens qui prennent le dabigatran pour prévenir les AVC **doivent le prendre pour le reste de leur vie.**



Il faut avaler la capsule entière – il ne faut pas la croquer ni la couper

SYMPTÔMES À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN



saignements des gencives



ecchymoses (bleus) fréquentes



saignements du nez

APPELEZ VOTRE MÉDECIN OU ALLEZ À L'URGENCE POUR CES SYMPTÔMES



difficulté à respirer / respiration sifflante



mal de ventre / vomissement contenant du sang



selles noires ou contenant du sang



mal de tête intense avec nausées

CONSEILS



Prenez le dabigatran à la même heure chaque jour, au moins 12 heures après votre dose précédente.

- N'arrêtez pas de le prendre sans d'abord en parler à votre médecin
- Si vous manquez une dose, vous courez le risque d'avoir des caillots de sang



Si vous oubliez une dose :

- Retard de 6 heures ou moins; prenez la dose oubliée.
- Retard de plus de 6 heures; ne prenez pas la dose oubliée
- Ne prenez jamais 2 doses à la fois
- Ne prenez jamais une dose supplémentaire pour rattraper la dose oubliée



Prenez rendez-vous avec votre médecin avant d'en manquer

- Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou une procédure, informez votre médecin ou dentiste que vous prenez du dabigatran



Portez un bracelet d'alerte médicale pour signaler que vous prenez du dabigatran. En cas d'urgence, l'équipe de soins doit le savoir.



Informez votre pharmacien ou médecin de tous les médicaments que vous prenez – vitamines, produits naturels et drogues à usage récréatif compris



Signalez tout effet secondaire à votre médecin ou pharmacien afin qu'ils puissent vous donner des conseils sur la façon de les minimiser



PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOS MÉDICAMENTS OU DE LA DIFFICULTÉ À LES PRENDRE